

## RINDER



Einzeldiagnostik  
Bestandsbetreuung  
Chirurgie & Innere Medizin  
Klauen- & Eutergesundheit  
Fruchtbarkeitsmanagement  
Geburtshilfe  
Kälberkrankheiten

## SCHWEINE



Bestandsbetreuung  
Betreuung Inhalationsnarkose  
Chirurgie & Innere Medizin  
Hygienemanagement  
Labordiagnostik  
Fruchtbarkeitsmanagement  
Fütterung & Stallklima

## PFERDE



Ambulante Fahrpraxis  
Prophylaxe  
Chirurgie & Innere Medizin  
Orthopädie  
Gynäkologie & Geburtshilfe  
Fohlenerkrankungen  
Zahnbehandlung

## KLEINTIERE



Prophylaxe  
Chirurgie & Innere Medizin  
Orthopädie / HD-Röntgen  
Kardiologie & Herzultraschall  
Inhalationsnarkose & Monitoring  
Züchterbetreuung / Progesteron  
Gynäkologie & Geburtshilfe  
Welpenerkrankungen  
Zahnbehandlung / Dentalröntgen  
Katzenfreundliche Tierarztpraxis  
Vogel- und Kleintierpraxis  
Bestandsbetreuung  
Stationäre Versorgung  
Hauseigenes Sofortlabor  
Futtermittelanalyse  
Hundeführerschein

[www.tierarztpartner-sulingerland.de](http://www.tierarztpartner-sulingerland.de)

**Praxis  
Schwaförden**

Scholer Straße 127  
27252 Schwaförden  
T 04277 963200

**Praxis  
Mellinghausen**

Am Höpen 39  
27249 Mellinghausen  
T 04272 1466

**Praxis  
Bassum**

Blumenstraße 14  
27211 Bassum  
T 04241 922855



# FLÖHE SYSTEMATISCH BEKÄMPFEN

Mit dem 4-Punkte-Programm

by Chriss-idee.de | fotos stock.adobe.com: Rinder ©konne Wierink | Schweine ©tralsen | Pferde ©callipso88 | Kleintiere ©Africa Studio



In Bereitschaft für Hufe, Klauen & Pfoten!

# FLÖHE SYSTEMATISCH BEKÄMPFEN



Ein akuter Flohbefall ist für betroffene Hunde und Katzen nicht nur lästig - er kann zugleich auch gesundheitliche Folgen haben. Wird ein Befall nicht konsequent behandelt, kann er sich zu einer langanhaltenden Plage ausweiten. Zugleich besteht immer auch die Gefahr der Übertragung mit unerwünschten Krankheitserregern. Tierhalter sollten ein akutes Flohproblem deshalb gezielt und vor allem systematisch angehen.

## Zeichen, die auf einen Flohbefall hindeuten:

- Dunkle Krümel im Fell bzw. der direkten Umgebung (= Flohkot).
- Hautrötungen bzw. Pusteln (u.a. an Bauch, Schwanzansatz oder Schenkelinnenseite).
- Unruhe und mitunter heftiger Juckreiz.
- Fellschäden bzw. Hautverletzungen als Folge des Kratzens.
- Großflächiger Haarausfall und Verdickung der Haut (im fortgeschrittenen Stadium).

## Das 4-Punkte-Programm

### Punkt 1

#### Flohbekämpfung am Tier

Ist ein akuter Befall bei Hund oder Katze diagnostiziert, sollte jede umfassende Behandlung mit einer Bekämpfung der ausgewachsenen Flöhe im Fell des Tieres beginnen. Da ausgewachsene und geschlechtsreife Flohweibchen bereits wenige Stunden nach der ersten Blutaufnahme mit der Paarung und anschließend mit der Eiablage beginnen, sollten Tierhalter schnell handeln.

### Punkt 2

#### Flohprophylaxe am Tier

Ein Flohbefall bei Hund oder Katze wird vom Halter nicht immer direkt bemerkt. So kann die Flohbrut bereits mit dem Legen von Eiern begonnen haben bevor erste Gegenmaßnahmen durch Tierarzt und Halter eingeleitet werden. Die Eier verteilen sich nach der Ablage in der Wohnung und die Larven verkriechen sich in unzugängliche Verstecke. Selbst wenn also ein Flohbefall am Tier nach wenigen Tagen mit Hilfe geeigneter Produkte angegangen wird, geschieht es nicht selten, dass es nach Wochen und Monaten zu einem erneuten Befall kommen kann, wenn Tierhalter nicht vorsorgen. Durch eine entsprechende Prophylaxe können Tierhalter einem erneuten Befall zuvorkommen. Da sich Flohlarven - je nach Jahreszeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit - unterschiedlich

schnell entwickeln, sollten Hund und Katze das ganze Jahr hindurch regelmäßig gegen Flöhe behandelt werden.

### Punkt 3

#### Flohbekämpfung in der Umgebung

Parallel dazu ist es wichtig, die direkte Umgebung von Hund und Katze ebenfalls von Flöhen zu befreien (siehe Punkt 2). Hierzu sollte die Wohnung regelmäßig gründlich gereinigt werden. Böden sollten geputzt, Teppiche und Polster gesaugt sowie Kissen und Decken bei mindestens 60°C gewaschen werden. Nach dem Staubsaugen ist es wichtig, den Beutel gut verschlossen zu entsorgen bzw. ihn zu verbrennen oder einzufrieren, um ein Entkommen der Flöhe zu verhindern. Flankiert werden sollten die Maßnahmen mit Hilfe geeigneter Anti-Flohpräparate, damit Eier und Larven auch in verwinkelten Ecken, Ritzen und Spalten bekämpft werden.

### Punkt 4

#### Bekämpfung des Bandwurms

Flöhe sind potenzielle Überträger des Gurkenkernbandwurms (*Dipylidium caninum*). Da ein Flohbefall demnach die Möglichkeit der Ansteckung mit dem Bandwurm beinhaltet, sollte nach einem Flohbefall stets eine Bandwurmkur erfolgen.

